

## Upute za agromjere kod kontejnerske sadnice maline/kupine



1. Nakon sadnje sadnicu zaliti sa 300-400 mml vode. Idealno je postaviti sistem za navodnjavanje kako bi putem vode mogli izvršiti i ferigaciju (navodnjavanje sa prihranom). Nakon sadnje izvršiti tretiranje sadnica sa preparatom Ridomil Gold u količini 200 grama/100 l vode po dunumu zalijevanjem sadnice (može i kroz sistem za vodu). DIOXI AKTIV SUPRA (hlor dioksid) 1l/1000 litara kroz sistem za vodu ili 1l/400 litara vode, oprskati. Kasnije se može koristiti kontaktni fungicid DITAN (mankozeb), zatim sistemični fungicid QUADRIS (azoksistrobin), 10 ml na 10 l vode. Sa Quadrisom može se miješati bilo koji insekticid. Od insekticida koristiti Aktaru, Kalipso, Mospilan itd.
2. Prva prihrana odmah po sadnji sa žutim kristalonom 1,2 kg/vodotopivog đubriva formulacije NPK (11-44-11), na 1000 litara vode po dunumu. Druga prihrana sa žutim kristalonom NPK (11-44-11) ponoviti za 7-10 dana. Cilj prihrane sa žutim kristalonom (povećani sadržaj fosfora), je da se biljka što bolje razvije korijenov sistem.
3. Poslije dvije prihrane sa žutim kristalonom, vrši se treća prihrana sa zelenim kristalonom NPK (20-20-20) u količini od 2 kg/1000 l vode po dunumu, 7-10 dana poslije prihrane sa žutim kristalonom.
4. Ova zadnja prihrana sa zelenim kristalonom može se ponoviti još dva-tri puta. Kada biljka poraste oko 40 cm koristiti KAN 27 % N u količini 5 kg/dunumu. Prihranu sa Kan 27%, vršiti u razmacima od 30 dana.
5. Prihranu poslije 20. avgusta ne vršiti, već samo biljke po potrebi navodnjavati. Zaštitu protiv insekticida vršiti insekticidom Calipso, Mospilan i sl.

- Može se poslije zadnje primjene vodotopivih đubriva koristiti i prihrana preko lista sa folijarnim đubrivima Fitofert, Basic Power i sl .
6. Osim, Ridomila Gold fungicida u mogu se koristiti i drugi fungicidi DIOKSI SUPRA AGRO (hlor dioksid), QUADRIS, ALIEET i dr). Preparate koristiti u skladu sa uputstvom za upotrebu.
  7. Pratiti redovno da vlažnost zemljišta bude umjerena (napraviti grudvu od zemlje da se ne mrvl i ne cijedi voda iz grudve, već da se napravi grudva umjerene vlažnosti). Korove redovno uništavati oko biljaka (okopavanje), međuredni prostor redovno kositi.
  8. Redni prostor maline izdici sa gredicama širine 1m. Gredica mora biti visoka 25-30 cm.